

WORLD BEDWETTING DAY

JOURNÉE MONDIALE DE L'ÉNURÉSIE NOCTURNE

PASSER A L'ACTION - LE 26 MAI 2020



HOURLA,
J'AI EU DE NOUVEAU
UNE NUIT SÈCHE


Le pipi au lit ou l'énurésie nocturne est défini comme une fuite involontaire d'urine pendant le sommeil¹

Le pipi au lit est un trouble fréquent chez l'enfant

Les causes les plus fréquentes de pipi au lit²


Réduction de la capacité de rétention de la vessie


Zzz
Incapacité à se réveiller


Surproduction d'urine pendant la nuit



Environ

15-20%

des enfants de 5 ans mouillent régulièrement leur lit³



il faut encourager les parents à consulter un médecin⁴

Le pipi au lit peut avoir des répercussions néfastes sur l'enfant.



La réussite scolaire et sociale⁵



Le bien-être émotionnel et l'estime de soi²



les activités quotidiennes²

**Le pipi au lit peut être traité.
Consultez un médecin pour plus d'informations.**

Pour plus d'informations concernant ce trouble médical, consultez le site



WWW.NUITSSECHES.BE



WWW.WORLDBEDWETTINGDAY.COM



La "Journée internationale de l'énurésie" a toujours lieu le dernier mardi de mai. L'objectif est de sensibiliser le public ainsi que le corps médical au fait que le pipi au lit est un trouble médical qui peut et doit être traité.

La journée mondiale de l'énurésie est une initiative d'un groupe de travail composé de membres des associations suivantes : ICCS (International Children's Continence Society), ESPU (European Society of Paediatric Urology), APUPU (Asia Pacific Association of Paediatric Urology), IPNA (International Paediatric Nephrology Association), ESPN (European Society of Paediatric Nephrology), SIUP (Sociedad Iberoamericana de Urología Paediatrica), North American Paediatric Urology Societies.

Références :

1. Austin P et al. The Standardization of Terminology of Lower Urinary Tract Function in Children and Adolescents: Update Report from the Standardization Committee of the International Children's Continence Society, The Journal of Urology. 2014;191:1863-1865.
2. Vande Walle J et al. Practical consensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr 2012; 171(6):971-983. Erratum in: Eur J Pediatr. 2012;171(6):1005 and in: Eur J Pediatr 2013;172(2):285.
3. Kiddoo D. Nocturnal enuresis. BMJ Clin Evid 2007;10:305.
4. Grzeda MT, et al. Examining the effectiveness of parental strategies to overcome bedwetting: an observational cohort study. BMJ Open 2017;7:e016749. doi:10.1136/bmjopen-2017-016749.
5. Maternik M. Understanding of and misconceptions around monosymptomatic nocturnal enuresis: findings from patient and physician surveys. J Pediatr Urol 2019;15:37.e1-37.e8.